

Лучевая диагностика (МРТ/КТ/РЕНТГЕН)						
проводимые исследования	время исследования	подготовка к исследованию	стоимость исследования	противопоказания	ОГРАНИЧЕНИЕ ВЕСА	ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Гистеросальпингография	40	НАЗНАЧЕНИЕ ВРАЧА	12000	<p>Выполняется только по назначению врача Абсолютные противопоказания: Беременность — риск облучения эмбриона и провокации выкидыша. Острые воспалительные заболевания органов малого таза (эндометрит, сальпингоофорит). Тяжёлые аллергические реакции на йодсодержащие контрастные вещества. Сильное маточное кровотечение. Злокачественные новообразования матки и шейки матки — риск</p>	110	<p>Гистеросальпингография (ГСГ) — это рентгенологическое исследование полости матки и маточных труб с введением контрастного вещества через цервикальный канал. Как проводится: Пациентка ложится на кресло. В шейку матки через катетер вводится рентгеноконтрастное вещество. Под контролем рентгена (флюороскопии) делают серию снимков для оценки проходимости труб и формы матки. Цель исследования: Диагностика причин бесплодия, выявление спаек, пороков развития матки, полипов, миомы и других внутриматочных патологий.</p>
		Очистка ЖКТ				
Ирригоскопия/ирригография (двойное контрастирование)	60	НАЗНАЧЕНИЕ ВРАЧА +результаты колоноскопии (если не противопоказана)	18 000	<p>Беременность — риск облучения эмбриона и провокации выкидыша. Подозрение на перфорацию кишечника — опасность попадания бария в брюшную полость → перитонит Острое воспалительное заболевание толстой кишки, например: Острый язвенный колит Болезнь Крона в стадии обострения Острый дивертикулит → риск перфорации, ухудшения состояния Тяжёлое общее состояние пациента, особенно: Декомпенсированные сердечно-сосудистые заболевания Резко выраженное истощение Тяжёлый сепсис Недавние хирургические вмешательства — первые 7–10 дней после операции Подтвержденная кишечная непроходимость — при полной механической непроходимости ирригоскопия противопоказана (может усугубить состояние) ВЕС БОЛЕЕ 110кг!</p>	110	<p>Ирригоскопия (ирригография с двойным контрастированием) — рентгенологическое исследование толстой кишки с введением бариевой взвеси и воздуха. Как проводится: Через прямую кишку с помощью насоса вводят бариевую взвесь. После заполнения кишечника выполняется серия рентгеновских снимков. Затем часть бария удаляют, вводят воздух для двойного контрастирования и делают повторные снимки. Цель исследования: Оценка формы, размеров, рельефа слизистой и выявление полипов, опухолей, дивертикулов, стриктур. Ирригоскопия (ирригография с двойным контрастированием) — рентгенологическое исследование толстой кишки с введением бариевой взвеси и воздуха.</p>
		Очистка ЖКТ				
Цистография нисходящая (синоним: экскреторная цистография)	45-60	НАЗНАЧЕНИЕ ВРАЧА креатинин	15 000	<p>Беременность Острая инфекция мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит) Кровотечение из мочевого пузыря Подтвержденная аллергия на контраст (йод) Тяжёлая почечная недостаточность (СКФ < 30 мл/мин/1.73 м²) Нарушение свертываемости крови (гемофилия) Острый воспалительный процесс органов малого таза (у женщин) ВЕС БОЛЕЕ</p>	110	<p>Контраст вводят внутривенно Он фильтруется почками → попадает в мочевой пузырь по мочеточникам Делают снимки, когда мочевой пузырь заполнен физиологическим путём</p>
Цистография восходящая (синоним: ретроградная цистография)	45-60	НАЗНАЧЕНИЕ ВРАЧА Очистка ЖКТ	15 000	<p>Острая инфекция мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит) Кровотечение из мочевого пузыря Подтвержденная аллергия на контраст (йод) Стриктура уретры Травма уретры Нарушение свертываемости крови Острый воспалительный процесс органов малого таза (у женщин)</p>	110	<p>Контраст вводят через катетер в мочевой пузырь (ретроградно) напрямую Делают снимки в покое, при натуживании (микции) и после мочеиспускания</p>

Фистулография	45	подготовка и проведение только с консультацией и в присутствии хирурга - зависит от места фистулы	9000	Абсолютные: Инфекция в области фистулы — исследование может усугубить воспаление или привести к распространению инфекции. Перфорация органа, особенно в области кишечника или мочевыводящих путей при возможном попадании контраста в перитонеум или другие ткани). Аллергия на контрастные вещества, йодосодержащие растворы. Относительные: Острые воспалительные заболевания в области фистулы (например, абсцессы). Беременность, хотя исследование с водорастворимым контрастом безопаснее	110	Фистулография — это рентгенологическое исследование, которое используется для диагностики и оценки состояния фистул (ненормальных соединений между органами или между органом и внешней средой). Контрастное вещество вводится в фистулу для выявления её анатомической структуры.
Экскреторная урография 50/100 мл - по умолчанию берем 50мл	30-60	НАЗНАЧЕНИЕ ВРАЧА Очистка ЖКТ креатинин	17 500/27000	Острая инфекция мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит) Кровотечение из мочевого пузыря Подтвержденная аллергия на контраст (йод) Тяжелая почечная недостаточность (СКФ < 30 мл/мин/1.73 м²) Нарушение свертываемости крови (гемофилия)	110	Контраст вводят внутривенно Он фильтруется почками → попадает в мочевой пузырь по мочеточникам Делают снимки по мере выведения контраста
Обзорная рентгенография органов брюшной	15	Бесшлаковая	3 000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	нет	
Рентгенография черепа	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография турецкого седла	10	не требует	2 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография височных костей (по Стенверсу,	15	не требует	3 400	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография пазух носа	10	не требует	2 900	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография костей носа	10	не требует	2 900	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография шейного отдела позвоночника	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография шейного отдела позвоночника с	20	не требует	4 500	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография грудного отдела позвоночника	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография пояснично-крестцового отдела	20	Очистка ЖКТ	4500	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография грудной клетки в прямой проекции	15	не требует	3 300	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография грудной клетки в боковой	10	не требует	2 400	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	рекомендуется назначать вместе
Рентгенография ребер - не берем	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	не берем рекомендовать КТ
Рентгенография грудины - не берем	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	не берем рекомендовать КТ
Рентгенография ключицы	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография лопатки	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография костей плеча	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография костей предплечья	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография костей голени	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография стопы	15	не требует	3 700	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография локтевого сустава	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография плечевого сустава	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография кисти и лучезапястного сустава	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография костей таза	15	Очистка ЖКТ	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография коленного сустава	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография голеностопного сустава	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография тазобедренного сустава	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография бедренной кости	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография крестцово-копчикового отдела	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография крестцово-подвздошных	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография пояснично-крестцового отдела	15	Очистка ЖКТ	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет	
Рентгенография костей голени	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	
Рентгенография пяточных костей	15	не требует	5 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110	2 ноги - при шпорах
Рентгеноскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки (синонимы: рентген с барием или бариевая рентгеноскопия ЖКТ)	45-60	Бесшлаковая диета за 1–2 дня СТРОГО НАТОШАК результаты ФГДС если не противопоказано	14 500	Абсолютные: Подозрение на перфорацию желудка или кишечника (в таких случаях используют водорастворимые контрастные вещества). Тяжелое общее состояние пациента (декомпенсированные заболевания сердца, дыхательной системы). Масса тела более 110 кг Относительные: Абсолютные: Подозрение на перфорацию желудка или кишечника (в таких случаях используют водорастворимые контрастные вещества). Тяжелое общее состояние пациента (декомпенсированные заболевания сердца, дыхательной системы). Масса тела более 110 кг	110	возможно отсроченное исследование
Рентгеноскопическое исследование пищевода (синоним: бариевая эзофагография)	45	Бесшлаковая диета за 1–2 дня СТРОГО результаты		Абсолютные: Подозрение на перфорацию желудка или кишечника (в таких случаях используют водорастворимые контрастные вещества). Тяжелое общее состояние пациента (декомпенсированные заболевания сердца, дыхательной системы). Масса тела более 110 кг	110	

Рентгенография пальцев кисти/стопы	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	нет
Рентгенография стоп в боковой проекции	15	не требует	4 200	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального	110
Компьютерная томография (КТ) головного мозга	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ органов шеи	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ-виртуальная бронхоскопия, бронхография	30	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ органов грудной клетки и средостения	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ органов брюшной полости и забрюшинного	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
Компьютерная томография органов таза	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ костно-суставной системы (в том числе	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ сосудов сердца для определения степени	20	не требует	15000	ЧСС более 100 или выраженная аритмия	200
КТ придаточных пазух носа	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ пирамид височных костей	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ-виртуальная колоноскопия/колонография -	60	Очистка ЖКТ	35000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ мозга с внутривенным (в/в) контрастированием	30	креатинин	35000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ органов шеи с в/в контрастированием	30	креатинин	35000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ органов грудной клетки и средостения с в/в	30	креатинин	35000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ брюшной полости и забрюшинного	30	креатинин	35000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ органов малого таза с в/в контрастированием	30	креатинин	35000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ органов брюшной полости и таза	30	Бесшлаковая	35000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ энтерография с контрастированием per os	30	ЖКТ ЭНТЕРО	22000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ энтерография с контрастированием per os и в/в болюсным контрастированием	30	креатинин	38000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
		ЖКТ ЭНТЕРО		ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (АЛЛЕРГИЯ) НА ЙОД почечная недостаточность (см. креатинин) Невозможность сохранять неподвижность Окружность талии, груди или бедер более 145см (за исключением обследований головы и ног)	
КТ сосудов и полостей сердца с в/в	30	креатинин	40000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
Компьютерно-томографическая ангиография -	30	креатинин	38000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ-кавернозография без учета стоимости	45	ПРОВОДИТ	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
Компьютерная томография – ангиография нижних	30	креатинин	53000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ – ангиография грудной аорты с	30	креатинин	38000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ – ангиография брюшной аорты с	30	креатинин	38000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ – ангиография всех отделов аорты с	30	креатинин	68000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
Двуэнергетическая КТ определение состава	20	не требует	15000	Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ-перфузия головного мозга - пока не	30	креатинин		Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
КТ-перфузия миокарда - пока не выполняем	30	креатинин		ЧСС более 100 или выраженная аритмия	200
КТ-перфузия внутренних органов - пока не	30	креатинин		Беременность - "безопасное окно" — 1–10 день менструального цикла	200
Магниторезонансная томография (МРТ) головного	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
Бесконтрастная МРТ ангиография сосудов	45	не требует	25000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
Бесконтрастная МРТ ангиография сосудов шеи	45	не требует	25000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ головного мозга с в/в контрастным усилением	45	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ гипофиза	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ гипофиза мозга с в/в контрастным усилением	60	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ орбит	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ орбит с в/в контрастным усилением	45	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ височно-нижнечелюстного сустава	45	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей лица	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей лица с в/в контрастным	45	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ головного мозга с целью исключения	45	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ плечевого сустава	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ локтевого сустава	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ лучезапястного сустава	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ кисти	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ тазобедренного сустава	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ коленного сустава	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ голеностопного сустава	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ стопы	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей плеча	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких предплечья	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей бедра	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140

МРТ мягких тканей голени	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей шеи	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ плечевого сустава с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ локтевого сустава с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ лучезапястного сустава с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ кисти с в/в контрастным усилением	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ тазобедренного сустава с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ коленного сустава с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ голеностопного сустава с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ стопы с в/в контрастным усилением	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей плеча с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких предплечья с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей бедра с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей голени с в/в контрастным	30	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей шеи с в/в контрастным	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей прочих анатомических зон	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ мягких тканей прочих анатомических зон с в/в	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ молочных желез с в/в динамическим контрастным усилением	60	5-12 день реультаты УЗИ	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ вторая фаза цикла (после 14 дня) — больше ложноположительных	140
МРТ органов брюшной полости и	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
Органы брюшной полости и МР-холангиография	30	не пить 40мин	25000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ томография органов брюшной полости и	30	бесшлаковая	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ органов таза - узнать цель (простата, Мужской или прямая кишка	30	Очистка ЖКТ	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
Женский - гинекология - стандарт		6-10 день цикла			
Женский на эндометриоз		14-16 день цикла			
МРТ органов таза с контрастированием - узнать Мужской или прямая кишка	30	Очистка ЖКТ	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
Женский - гинекология - стандарт		6-10 день цикла			
Женский на эндометриоз		14-16 день цикла			
МРТ шейного отдела позвоночника и	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ грудного отдела позвоночника и	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ шейного отдела позвоночника и	30	креатинин если	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ грудного отдела позвоночника и	30	креатинин если	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника	45	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с	45	креатинин если	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ подвздошно-крестцовых сочленений	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ подвздошно-крестцовых сочленений с в/в	45	креатинин если	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ органов мошонки	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ органов мошонки с в/в контрастированием	45	креатинин если	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ полового члена	30	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ полового члена с в/в контрастированием	45	не требует	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ органов грудной клетки - чаще всего	45	не требует	23000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ органов грудной клетки с в/в	60	креатинин если	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ сердца - пока не делаем	45	направление и	38000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МРТ сердца с в/в контрастированием - пока не	60	направление и	47000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140
МР-энтерография с в/в контрастированием	60	ЖКТ ЭНТЕРО	49000	ОБЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К МРТ	140